

## IV. Betegtájékoztató

### FUMAGO oldat

**Mielőtt elkezdni alkalmazni ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz!**

Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza!

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez!
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak!

#### **Tulajdonság, hatás:**

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, mely összetevőinek hatását szakirodalmi adatok igazolják.

Hatás: A Fumago oldat különböző testrészeken, hajlatokban, hajas fejbőrön kialakuló száraz, hámló bőr ápolására, egyes bőrbetegségek – így a pszoriázis, atópiás bőrgyulladás – gyógykezelésére és ápolására szolgáló készítmény, mely természetes hatóanyagokat tartalmaz. Csökkenti a gyulladáshoz vezető tüneteket és segíti a bőr felső, elszarusodott rétegének leválását.

#### **Mi a készítmény hatóanyaga?**

*1 ml Fumago oldat tartalma:* 0,98 ml orvosi füstike virágos hajtás (*Fumaria officinalis* L.; herba) folyékony kivonat és 16,6 mg páfrányfenyő levél (*Ginkgo biloba* L.; folium) száraz kivonat.

#### **Milyen anyagokat tartalmaz még a készítmény?**

*Segédanyagok:* tisztított víz, etanol, glicerin.

#### **Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?**

A Fumago oldat alkalmas az atópiás és a pszoriásisos bőr gyulladáshoz vezető tüneteinek enyhítésére, valamint a száraz, igénybe vett tünetmentes bőr ápolására.

Enyhébb esetekben, önmagában is hatásos.

Súlyosabb esetekben az erős hatású készítményekkel történő kezelések szüneteiben fenntartó kezelésként alkalmazható.

#### **Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni?**

- A készítmény összetevőivel szembeni egyéni túlérzékenység esetén,
- a szem környékén és nyálkahártyákon.

### **Mit kell tudnia a kezelés megkezdése előtt?**

Ez a készítmény 0,33 g alkoholt (etanolt) tartalmaz milliliterenként.  
Sérült bőrfelületen égő érzést okozhat.

A termék kizárólag gyógynövény kivonatokat tartalmaz, vizes-glicerines-etanolos oldatban.  
Szemek környékén és nyálkahártyákon nem alkalmazható.

### **Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek is?**

A Fumago oldat biztonságos alkalmazhatóságára vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, ezért általános óvatosságból gyermekek és serdülők számára a készítmény alkalmazása nem javasolt.

### **Alkalmazható-e a készítmény gyógyszerekkel egyidejűleg?**

A helyileg alkalmazott készítmény a szájon át szedett gyógyszerek hatását nem befolyásolja.  
Más helyi készítmény azonos testfelszínen történő egyidejű alkalmazását kerülni kell.

### **Mi a teendő, ha Ön várandós, szoptat vagy gyermeket szeretne?**

Ezen élethelyzetekben nem végeztek vizsgálatokat, ezért általános óvatosságból a készítmény alkalmazása nem javasolt.

Ha Ön gyermeket szeretne, a készítmény alkalmazásának megkezdése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével!

### **Hogyan és mikor kell a készítményt alkalmazni?**

Az érintett területre a tünet súlyosságától függően naponta 3-4 alkalommal kell az oldatot csepegtetni, majd enyhe bedörzsöléssel ajánlott a bőrbe juttatni. Rendszeres fenntartó kezeléssel a tünetek ismételt megjelenése megakadályozható, ill. mérsékelhető. Az oldatos forma a fejbőr pszoriázisos megbetegedése esetén is alkalmazható.

### **Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?**

A Fumago oldat a kívánt hatás eléréséig folyamatosan alkalmazható. Tünetmentes periódusban rövid szünetek közbeiktathatóak, vagy a kezelést ritkábban végezhetjük.

### **Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?**

A készítménynek tulajdonítható mellékhatást eddig nem jelentettek.

A készítmény összetevőivel szembeni egyéni túlérzékenység előfordulhat.

A kezelés helyén mással összefüggésbe nem hozható heveny gyulladásos tünet (bőrpír, melegség érzés, duzzanat) jelentkezik, a kezelést fel kell függeszteni.

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét!  
Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt, bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

### **Hogyan kell tárolni a készítményt?**

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A készítmény gyermekektől elzárva tartandó!

**Nyilvántartási szám:** OGYI-1011/2007

### **Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás?**

*Leírás:* sötétbarna, átlátszatlan, külsőleges folyadék.

*Csomagolás:* fehér LDPE cseppentő betéttel ellátott barna folyadék üveg

fehér, garanciazáras HDPE kupakkal lezárva, dobozban.  
*Csomagolási egység: 30 ml/üveg/doboz*

**Forgalomba hozatali engedély jogosultja:**

Gradiens Termékfejlesztő Kft.

2074 Perbál, Levendula u. 1.

Tel.: 460 0804, Fax:460 0427

E-mail: [gradiens@gradienskft.hu](mailto:gradiens@gradienskft.hu)