

3. Betegtájékoztató:

Információk a felhasználó számára

CARNIVIT MAX kemény kapszula

Mielőtt elkezdi szedni ezt a kapszulát, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz!

Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje!

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei a készítmény során nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

Tulajdonság, hatás:

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, mely összetevőinek hatását szakirodalmi adatok igazolják.

A szív és keringési rendszer egészséges működésének fenntartására szolgáló gyógyhatású készítmény.

Mi a készítmény hatóanyaga?

1 kapszula hatóanyag tartalma: 50 mg magnézium (322 mg Magnesii aspartas tetrahydricus et Magnesii oxidum leve), 48 mg, 50 mg karnitin (80 mg L-carnitin-L-tartras).

Mit tartalmaz még a készítmény?

A kapszulahéj összetevői: zselatin, titán-dioxid.

Mikor ajánlott a készítmény szedése?

Elsősorban stressz, idegesség, kimerültség okozta átmeneti (enyhe-, múló) szív- és érrendszeri panaszok esetén.

Mikor nem szabad a készítményt szedni?

A készítmény összetevőivel szembeni egyéni túlérzékenység esetén, és súlyos veseelégtelenség fennállásakor nem szedhető.

Mit kell tudnia a kapszula szedésének megkezdése előtt?

Máj-, vese-, pajzsmirigy betegség fennállásakor a készítmény szedésének megkezdése előtt beszéljen kezelőorvosával.

Gyógyszeres kezelést igénylő cukorbetegségben a kapszula csak kellő elővigyázattal szedhető, mert szükség lehet az inzulin vagy a vércukorszint-csökkentő gyógyszerek adagjának módosítására.

Gyomorfekély fennállásakor és túlzott savérzékenység esetén a készítményt nem ajánljuk.

A magnéziumpótlás, mint kiegészítő terápia előnyös lehet az enyhe szív-, és érrendszeri panaszok (vérnyomás, koszorúér betegség) fennállásakor.

Amennyiben ilyen esetben alkalmazza a készítményt, a szedés megkezdése előtt konzultáljon kezelőorvosával, mert esetenként szükség lehet a kezelések összehangolására.

Szedhetik-e a készítményt gyermekek is?

A Carnivit-Max készítmény biztonságos alkalmazhatóságára gyermekkorban nincs elegendő adat, ezért általános óvatosságból, gyermekek számára a készítmény alkalmazása nem javasolt.

Szedhető-e a készítmény gyógyszerekkel egyidejűleg?

- Emésztőrendszeri- és szívre ható gyógyszeres kezelésben részesülők tájékoztassák kezelőorvosukat a Carnivit Max kapszula szedéséről.

- A magnézium gátolja bizonyos gyógyszerek felszívódását (aminoquinolinok, quinidin és quinidin származékok, nitrofurantoin, penicillamin és tetraciklinek), ezért ezen gyógyszerek és a Carnivit Max kapszula bevétele között legalább 2-3 óra teljen el.

- A magnézium csökkentheti a vasszívódást.

- A magnézium gátolhatja a digitálisz glikozidok felszívódását, digitálisz glikozidok egyidejű szedése. Ezért, ha digitálisz glikozid tartalmú gyógyszert szed, beszéljen kezelőorvosával, mielőtt elkezdi szedni a kapszulát.

- Valószínűsíthető, hogy a karnitin fokozza a kumarin-származékok antikoagulens hatását.

Mi a teendő, ha Ön várandós, szoptat vagy gyermeket szeretne?

Ezen élethelyzetekben nem végeztek vizsgálatokat, ezért általános óvatosságból a készítmény szedése nem javasolt.

Ha Ön gyermeket szeretne, a készítmény szedésének megkezdése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével!

Hogyan és mikor kell a készítményt alkalmazni?

Preventív céllal naponta 2-3x1-2 kapszula, legfeljebb 5 kapszula naponta.

Fenntartó kezelésre naponta 2x2 kapszula.

A kapszulát étkezésekkel egyidejűleg javasolt bevenni.

Mennyi ideig szedhető a készítmény?

Rendszeresen, megszakítás nélkül is szedhető, de figyelembe kell venni a „Mire kell még ügyelnie a készítmény alkalmazása során?” pontban foglaltakat.

Milyen mellékhatásai lehetnek a készítménynek a szedése során?

A készítmény összetevőivel szemben fennálló egyéni érzékenység esetén allergiás reakciók jelentkezhetnek.

A készítmény szedése során ritkán (főleg a javasolt adag túllépés esetén) gyomor-bélrendszeri panaszok, hasi fájdalom, (enyhe) hasmenés, hányás jelentkezhet. Amennyiben enyhe hasmenés lép fel és ez nem múlik el pár napon belül, a készítmény szedését abba kell hagyni, és orvoshoz kell fordulni.

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt, bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

Mire kell még ügyelnie a készítmény alkalmazása során?

Ne lépje túl a készítmény javasolt napi adagját. A javasolt adag túllépésekor, kb. napi 1 grammot meghaladó fogyasztás haszagt okozhat, a bélbaktériumok karnitin bontása miatt.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A készítmény gyermekektől elzárva tartandó!

Milyen a kapszula külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Leírás: 450 mg fehér színű, amin szagú, savanykás ízű por fehér színű zselatin kapszulában.

Csomagolás: garanciazáras PE tartályban és dobozban.

Csomagolási egység: 60 db kapszula

Nyilvántartási szám: OGYI-1021/2007

Gyártó/Forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Gradiens Termékfejlesztő Kft.

2074 Perbál, Levendula u. 1.